

RED DE HIBRIDOS DE MAÍZ EN FECHA DE SIEMBRA TARDIA 1819

Respuesta a la aplicación de fungicidas por híbrido.

Localidad: El Socorro

Fecha de siembra: 8/12

Momento de aplicación: V8



REGIÓN SUR
DE SANTA FE




CORTEVA™

Stinger

Picoxystrobin + Cyproconazole 600cc/ha

CV	4,06
----	------

F.V.	p-valor	DMS
Tratamiento	0,0515	293
Tratamiento*Híbrido	0,9917	880



RED DE HIBRIDOS DE MAÍZ EN FECHA DE SIEMBRA TARDIA 1819

Respuesta a la aplicación de fungicidas por híbrido.


Evaluaciones realizadas por Lucrecia Couretot



REGIÓN SUR DE SANTA FE



CORTEVA



RED DE HIBRIDOS DE MAÍZ EN FECHA DE SIEMBRA TARDIA 1819

Respuesta a la aplicación de fungicidas por híbrido.

Evaluaciones realizadas por Lucrecia Couretot



REGIÓN SUR
DE SANTA FE



CORTEVA™

Híbrido	%SEVERIDAD TIZÓN				
	Inicial	Lechoso		Pastoso	
	V8-V9	Fungicida	Testigo	Fungicida	Testigo
DK 7210	0	0	0	0	0
LT 723	0	0	0	0	1
DK 7220	0	0	4	0	0
Next 22.6	0	0	2	0	1
ACRUX	0	0	3	0	1 (Ht)
DS 507	0	0	4	0	1 (Ht)
NEXT 20.6	0	0	0	0	1 (Ht)
AX 7784	0	3	3	0	0
SRM 6620	0	1	1	0	1 (Ht)

Híbrido	Tratamiento	% Severidad Bacteriosis
SRM 6620	Fungicida	15%
	Testigo	20-25%
DK 7210	Fungicida	15%
	Testigo	30%
NEXT 20.6	Fungicida	10-15%
	Testigo	20%
DK 7320	Fungicida	3%
	Testigo	5%

RED DE HIBRIDOS DE MAÍZ EN FECHA DE SIEMBRA TARDIA 1819

Respuesta a la aplicación de fungicidas por híbrido.

Respuesta por híbrido



REGIÓN SUR
DE SANTA FE



CORTEVA™

